

## **TREMPLIN, étude phase II randomisée GETTEC/GORTEC**

**Patients non pré-traités candidats à une laryngectomie totale (larynx ou hypopharynx)**

- **endoscopie et scanner**
- **3 cycles TPF (75, 75, 750)**
- **endoscopie et scanner**
  - R < 50% (P)LT + curage +/- RT postop**
  - R > 50 % randomisation**
    - RT conventionnelle + C (100 x 3)**
    - RT conventionnelle + E (400, 250 x 7)**
- **3 mois après fin TT : endoscopie + scanner +/- chir rattrapage**
- **18 mois après fin TT : endoscopie + scanner**

# **TREMPLIN, étude phase II randomisée GETTEC/GORTEC**

**Au 15 décembre 2006**

**64 patients inclus**

**29 patients randomisés**

**RT + C      16 patients**

**RT + E      13 patients**

## Effets indésirables sérieux (SAE)

	<b>grade 3</b>	<b>grade 4</b>
<b>neutropénie fébrile</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>anémie</b>	<b>1</b>	
<b>aplasie</b>	<b>3</b>	
<b>insuffisance rénale</b>	<b>1</b>	
<b>diarrhée</b>	<b>NP</b>	
<b>syndrome coronarien</b>	<b>NP</b>	
<b>mucite</b>	<b>1</b>	
<b>oesophagite</b>	<b>NP</b>	
<b>nécrose intestinale</b>		<b>1</b>
<b>pneumonie</b>	<b>NP</b>	
<b>choc</b>		<b>1</b>